



WSTRZAŚ ANAFILAKTYCZNY

GWAŁTOWNE OBJAWY PO KONTAKCIE Z ALERGENEM (nie muszą występować równocześnie)

- nagła duszność, krztuszenie, trudność w nabraniu powietrza, świszczący oddech
- omdlenie, utrudniony kontakt
- nagle, uporczywe wymioty, silne kurczowe bóle brzucha
- szybko postępująca pokrzywka, obrzęk warg, powiek, swędzący rumień

MOŻESZ URATOWAĆ LUDZKIE ŻYCIE


1. Połóż chorego i **unieś jego nogi ku górze**
2. Głośno wołaj o pomoc 
3. Zadzwoń **112** lub **999** i wezwij pomoc medyczną 
4. Jeżeli chory ma przy sobie **adrenalinę...**




PODAJ MU DOMIĘŚNIOWO ADRENALINĘ

w przednio-boczną powierzchnię uda w jego 1/3 górnej części


ADRENALINA W AUTOWSTRZYKIWACZU



1. Chwyć wstrzykiwacz tak, aby dłoń była zaciśnięta w pięść wokół wstrzykiwacza, a pomarańczowa końcówka była skierowana w dół. Drugą ręką zdejmij niebieskie zabezpieczenie.




2. Trzymaj pomarańczową końcówkę ok. 10 cm od uda i przez ubranie uderz mocno w środkową część uda (usłyszysz kliknięcie).



3. Przytrzymaj wstrzykiwacz 5 sekund przy udzie, a następnie odciągnij na bok. Rozmasuj miejsce wstrzyknięcia.

ADRENALINA wskazówki stosowania u dzieci w zależności od wagi dziecka

- **7,5-15 kg:**
adrenalina w autowstrzykiwaczu,
dawka 0,15 mg*, opcjonalnie 0,1 mg**
- **15-25 kg:**
adrenalina w autowsztrzykiwaczu,
dawka 0,15 mg
- **> 25 kg:**
adrenalina w autowsztrzykiwaczu,
dawka 0,3 mg



* dawkowanie poza rejestracją, ** preparat niedostępny w Polsce

PO PODANIU ADRENALINY ZAWSZE WEZWIJ POMOC MEDYCZNĄ!

Opracowanie:

PTGHIŻ 2021, dr Andrea Horvath, prof. Elżbieta Jarocka-Cyrta, dr Agnieszka Krauze, dr Łukasz Błażowski

PTGHIŻ